



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Нобивак® Puppy DP

Разработчик лекарственного препарата: Интервет Интернешнл Б.В., Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands

Номер регистрационного удостоверения: 528-1-4.17-4134№ПВИ-1-1.4/01555

**I. Общие сведения**

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Нобивак® Puppy DP (Nobivac® Puppy DP)

международное непатентованное наименование: вакцина против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита собак живая сухая.

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций.

В одной дозе вакцины содержатся действующие вещества: живой вирус чумы плотоядных (штамм *Onderstepoort*) - не менее 5,0 lg ТЦД<sub>50</sub>; живой парвовирус собак (штамм 154) - не менее 7,0 lg ТЦД<sub>50</sub> и вспомогательные вещества: сорбитол, гидролизованный желатин, панкреатический гидролизат казеина, динатрия гидрофосфат дигидрат и вода для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой лиофилизированную массу от почти белого до кремового цвета.

Срок годности вакцины в закрытой упаковке производителя 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. Использовать в течение 30 минут после растворения. Не применять по истечении срока годности.

4. Вакцина расфасована по 1 дозе (0,5 мл – объем до лиофилизации) в стеклянные флаконы. Флаконы с вакциной укупорены резиновыми пробками, укреплены алюминиевыми колпачками и упакованы по 10 штук в картонные или пластиковые коробки вместе с инструкцией по применению вакцины на русском языке.

5. Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Вакцина или отходы, возникшие после ее использования, подлежат утилизации в соответствии с требованиями законодательства (путем кипячения, сжигания или погружения в соответствующее дезинфицирующее средство).

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Биологические свойства

9. Нобивак® Puppy DP – иммунобиологический лекарственный препарат для ветеринарного применения (вакцина).

10. Вакцина Нобивак® Puppy DP вызывает формирование иммунного ответа у щенков против возбудителей чумы плотоядных и парвовирусной инфекции собак через 10 дней после вакцинации, который сохраняется в течение 4 недель. Поскольку материнские антитела могут влиять на формирование иммунитета у щенков, после вакцинации препаратом Нобивак® Puppy DP рекомендуется проводить ревакцинацию препаратами Нобивак® DHP или Нобивак® DHPi.

## III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для активной иммунизации щенков против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита собак.

12. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

При случайном введении препарата человеку следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению вакцины или этикетку).

14. Вакцина предназначена для иммунизации щенков, не предназначена для применения щенным и лактирующим сукам.

15. Вакцинации подлежат клинически здоровые щенки с 6-недельного возраста. В случае, если необходима более ранняя защита от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита, щенков вакцинируют в возрасте 4 недель. Перед проведением вакцинации осуществляют полный клинический осмотр животного. В процессе вакцинации следует использовать стерильные материалы и избегать контакта вакцины с дезинфицирующими средствами или спиртом.

В качестве растворителя вакцины Нобивак® Puppy DP можно использовать Нобивак Дилуент или вакцины Нобивак® Lerto или Нобивак® L4. Во флакон с вакциной с помощью стерильного шприца вносят 1 мл растворителя или 1 мл одной из вышеуказанных вакцин, тщательно встряхивают и после растворения вводят животному подкожно с соблюдением правил асептики и антисептики.

Поскольку иммунизация препаратом Нобивак® Puppy DP может являться частью более полной программы вакцинации, рекомендуются следующие схемы вакцинации:

<i>Программа вакцинации для щенков с угрозой заражения чумой плотоядных или парвовирусным энтеритом; статус материнских антител неизвестен</i>	
возраст 4-6 недель	Нобивак® Puppy DP
возраст 8-10 недель	Нобивак® DHPPi или Нобивак® DHP совместно с Нобивак® Lepto или Нобивак® L4
возраст 12 недель	Нобивак® DHPPi или Нобивак® DHP совместно с Нобивак® Lepto, Нобивак® L4, Нобивак® Rabies или Нобивак® RL
<i>Программа вакцинации для щенков в возрасте с 8-10 недель</i>	
возраст 8-10 недель	Нобивак® DHPPi или Нобивак® DHP совместно с Нобивак® Lepto или Нобивак® L4
возраст 12 недель	Нобивак® DHPPi или Нобивак® DHP совместно с Нобивак® Lepto, Нобивак® L4, Нобивак® Rabies или Нобивак® RL
<i>Программа вакцинации для щенков в возрасте от 12 недель и которых ранее не вакцинировали</i>	
возраст 12 недель	Нобивак® DHPPi или Нобивак® DHP совместно с Нобивак® Lepto, Нобивак® L4, Нобивак® Rabies или Нобивак® RL
возраст 14-16 недель	Нобивак® Lepto или Нобивак® L4
<i>Ревакцинация</i>	- против чумы плотоядных, инфекционного гепатита собак, парвовирусной инфекции собак и респираторных инфекций, вызываемых аденовирусом собак типа 2 – каждые 3 года; - против лептоспироза и респираторных инфекций, вызываемых вирусом парагриппа – каждый год; - против бешенства – каждые 3 года (частота ревакцинации может быть увеличена в случае угрозы заражения вирусом бешенства или согласно требованиям законодательства)

16. В случае возникновения у вакцинированных животных реакции гиперчувствительности анафилактического типа назначают симптоматическое лечение.

17. Патологических признаков при передозировке вакциной (при введении 10-кратной дозы) не установлено.

18. Допускается применение вакцины Нобивак® Puppy DP совместно с растворителем Нобивак® Дилуент или инактивированными вакцинами Нобивак® Lepto или Нобивак® L4, которые служат одновременно растворителями. Не смешивать с другими лекарственными препаратами. Информация о совместном применении Нобивак® Puppy DP с другими лекарственными препаратами для ветеринарного применения отсутствует. Решение об использовании других препаратов до или после вакцинации принимается ветеринарным врачом в индивидуальном порядке.

19. Особенности поствакцинальной реакции при первичной иммунизации не установлены.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики чумы плотоядных и парвовирусного энтерита.

21. Вакцина Нобивак® Purru DP не предназначена для применения продуктивным сельскохозяйственным животным.


Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Интервет Интернешнл Б.В., Вим Де Кёрверстраат 35, 5831 AN Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Интервет» (143345, РФ, Московская область, город Наро-Фоминск, рабочий поселок Селятино, ул. Промышленная, дом 81/1)

Директор по регуляторным вопросам и выводу препаратов на рынок ООО «Интервет»



Самочернова А.В.